



06-20-980-4449

Hegedűs Zsolt

KukoricaVetomag.hu – Országos vetőmag webáruház

- Rendeljen kukorica vetőmagot kedvező áron **webáruházunkban**, vagy **telefonon**!
- Kedvezményes országos házhozszállítás, díjmentes raktári átvétel Kecskeméten.
- Kérdése van? Hívjon! **06-20-980-4449**

KukoricaVetomag.hu


Vetőmag megbízható helyről, olcsón és időben, 2005 óta!

Hivatalos fémzárolt **kukorica, napraforgó, cirok** vetőmagok kedvező áron:

Dekalb, Syngenta, Pioneer, KWS, Marton Genetics, Gabonakutató, Agromag, RAGT, LG Limagrain, Kiskun Kutatóközpont, Saaten Union, RWA, American Genetics, Caussade Semences, BC Institut, NS Seme.



syngenta



Kukorica 2026 **katalógus**

*Ismerje meg kukoricatermesztőknek szóló
integrált ajánlatunkat!*

MEGBÍZHATÓAN
ÖN MELLETT



TARTALOM



<i>Integrált portfólió</i>	<i>4</i>
<i>FieldView</i>	<i>6</i>
<i>Accelaron</i>	<i>8</i>
<i>Robust</i>	<i>10</i>
<i>FieldShield</i>	<i>12</i>
<i>Tőszámajánlás</i>	<i>16</i>
<i>FieldView</i>	<i>18</i>
<i>Növényvédelem</i>	<i>20</i>
<i>DEKALB hibridek</i>	<i>28</i>
<i>Kukorica hibridportfólió 2026</i>	<i>78</i>

TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS AZ ÖN SZÁMÁRA

Fókuszban a kukorica.

Kínálatunkban a kukoricatermesztés első percétől az utolsóig megtalálja megoldási javaslatainkat aktuális nehézségeire – a hibridspecifikus tőszámajánlattól a gyomszabályzáson és a növényvédelmi kihívásokon át egészen a releváns adatelemzésig. Forduljon bizalommal kollégáinkhoz, akik segítenek meghozni a helyes döntést minden helyzetben.

1 TERVEZÉS

Az előző évjáratok tapasztalatai és a várható termésszint alapján történő hibrid- hibridspecifikus tőszám kiválasztása, valamint differenciált tőszámú vetési tervek elkészítése.



6 BETAKARÍTÁS

Táblaszintű és táblán belüli, hozamtérképes elemzés a Climate FieldView felületén, kényelmesen és egyszerűen.



5 KÁRTEVŐK ÉS KÓRKOZÓK

Integrált szemléletben történő toxinmenedzsment az egészséges termésért.



2 VETÉS

Fejlett vetőmagvédelmi megoldásaink és a vetésminőséget jelző paraméterek monitorozása a Climate FieldView segítségével.



3 GYOMSZABÁLYOZÁS

Széles hatásspektrumú herbicidkínálat, mely megoldást nyújt az adott évjárat és gyomflóra által okozott kihívásokra.




4 HATÁRSZEMLE

Műholdképek és fejlett algoritmusok által készített biomasszatérképek, melyek detekálhatóvá teszik a problémás területeket.




HOZZON MEGALAPOZOTT DÖNTÉSEKET!


Minden szezonban számtalan kritikus döntést kell meghoznia. A FieldView itt van, hogy segítsen minden lépésnél. Elemesse a szezonban történeteket, nézze meg mi működött jól, integrálja más digitális mezőgazdasági platformokkal, és konzultáljon szaktanácsadóival – a FieldView segítségével egy személyre szabott tervet készíthet, amely a sikerhez vezet.



A FieldView segít nyomon követni az összes információt, amire szüksége lehet a helyes döntések meghozatalához: **Hogyan befolyásolták a vetési dátumok a növények kelését, fejlődését? Mely műtrágyák és növényvédelmi stratégiák hozták a legjobb eredményt? És hogyan fejlődik a gazdaság termelékenységése az évek során?** Mélyedjen el a földterületei adataiban, és találja meg az összefüggéseket!



Jusson hozzá a szezon eredményeihez egy szempillantás alatt! A „Hozamelemzés” fül jelentést ad a teljes betakarított területéről, valamint a száraz és nedves hozamokról. **Hasonlítsa össze, hogy mely területek teljesítettek átlag felett** és melyek teljesítettek az üzemi átlag alatt! Ezt követően további elemzéseket végezhet és megalapozott döntéseket hozhat a következő szezonra. Ugyanez vonatkozik a hibridekre is.



A FieldView hozamelemzési eszközeivel mélyebben megértheti az előző szezon terméseredményeinek eltéréseit. Jelöljön ki egy táblarészt és hagyja, **hogy a FieldView részletes eredményeket mutasson be földje minden négyzetméteréről!**

VÁLTSZA AZ INFORMÁCIÓT CSELEKVÉSRE!

Egy kiszámíthatatlan környezetben minden döntés számít. A FieldView lehetővé teszi az Ön számára, hogy gyors, adatvezérelt döntéseket hozzon azért, hogy maximalizálhassa a hektárjaiban rejlő potenciált.



Kultúrnövényeinek gondozása azt jelenti, hogy tudja, mi történik a földjén. A szezon során **a FieldView értesítést küld, mely területek mutatnak jelentős eltérést a növények fejlődésében**, amit a monitoring-térképen a piros területek jeleznek (a jobb oldali képen). Így azonnal reagálhat a folyamatban lévő problémákra.

Amikor szemlézi területeit és észlel egy problémát, megjelölheti azt emlékeztetőként. Sőt, kategorizálhatja is: **betegség, rovar, gyom, tápanyag- vagy vízhiány, netán valami más?** A jelöléssel elmenti a kategóriát is, így egy pillanat alatt vissza tudja idézni, mi volt a probléma. Képeket is csatolhat hozzá, így nem kell papíralapú jegyzeteket rendezgetnie vagy fotókat kezelnie a telefonján. Minden jelölés georeferált, így pontosan lokalizálhatja azokat a beavatkozásokhoz vagy a jövőbeni ellenőrzéshez.



KIEMELT VÉDELEM MÁR A KEZDETEKTŐL

ACCELERON®
VETŐMAGVÉDELMI
MEGOLDÁS

A sikeres kukoricatermesztés azzal kezdődik, hogy megvédjük a vetőmagokat a kártevőktől, csírákori kórokozóktól és más stresszfaktoroktól. Manapság a csíranövényeknek azonban több kell: folyamatos tápanyagellátottság a robbanásszerű fejlődés eléréséhez.

Itt jön képbe az Acceleron® vetőmagvédelmi megoldás. Megvédi a kukoricamagokat a korai veszélyektől, mialatt **a biostimulátorok**

elősegítik a nagyobb funkcionális gyökértőmeg fejlődését – növelve a víz- és tápanyag-felvételt a mikorrhiza gombákkal való szimbiózis révén. **Az eredmény egészségesebb, egyenletesebb növényállomány a növekedés kezdetétől fogva.**

Az Acceleron® vetőmagvédelmi megoldás segítségével erőteljes kezdeti fejlődést adhat növényeinek, segítve a bőséges termés elérését.

Védelem a kezdetektől



Új vetőmagbevonat

Továbbfejlesztett oldhatóság



Biostimulátor

Fokozza a víz- és tápanyag-felvételt – növeli a funkcionális gyökértömeget




Gombaölő szer



Rovarölő szer


Védelem a csírákori betegségek és kártevők ellen



PRESZIMBIOTIKUS KÖLCSÖNHATÁSOK


A B-360 tartalmazza az LCO (Lipochitooligosacharid) molekulát, amely központi szerepet játszik a növényi gyökerek és a mikorrhiza gombák közötti szimbiotikus kapcsolatban. A B-360 kétféleképpen hat:

1. jelet küld a növénynek, amely megnyitja a gyökérsejtek ajtáját a mikorrhiza gombák előtt;
2. serkenti a mikorrhiza gombák spóráinak csírázását, hifákat termelve.



MIKORRHIZÁLIS SZIMBIÓZIS KIALAKULÁSA

A mikorrhizas gombák ezután bejutnak a gyökérsejtjeibe, kapcsolódnak és kialakul a szimbiózis.



NAGYOBB FUNKCIONÁLIS GYÖKÉRTÖMEG

A funkcionális gyökértömeg (növényi gyökér + mikorrhiza gombahálózat) jelentősen megnő, így a növény nagyobb felületen fér hozzá a vízhez és tápanyagokhoz.

+2%

hozamnövekedés*

Vetőmagvédelmi megoldások eltérő igényekre szabva

	ACCELERON® STANDARD	ACCELERON® STANDARD + KORIT 420 FS	ACCELERON® STANDARD + FORCE 20 CS
Gombaölő szer	✓	✓	✓
Biostimulátor	✓	✓	✓
Rovarölő szer			✓
Madárriasztó		✓	


* 43 kisparcellás kísérleti helyszín alapján - 6 ismételtes/kezelés - EU, 2017.

ROBUST – HIBRIDEK A LEGEXTRÉMEBB KÖRÜLMÉNYEKHEZ


A DEKALB portfólió jól ismert hibridjei, amelyek több éve kiemelkednek termőhely- és évjárat-stabilitásukkal.

Miért hoztuk létre a ROBUST minősítést?

A genetikai előrehaladásnak köszönhetően folyamatosan egyre nagyobb hozamteljesítményű DEKALB hibrideket nemesítünk, melyek felülmúlják elődeiket. A ROBUST koncepciót azon termelők számára fogalmaztuk meg, akik a legextrémebb feltételek mellett termelnek kukoricát. Akik számára a termésbiztonság növelése a legfontosabb törekvés. Azoknak szól, akik bevált, jól ismert, nagy tűrőképességű, stabil teljesítményű hibrideket keresnek, amelyeket akár csökkentett tőszámmal, visszafogott inputanyag-felhasználással is eredményesen tudnak termeszteni.



A ROBUST hibridek elnyújtott életpályával rendelkeznek, hosszabb ideig elérhetőek



Hibridkiválasztási kritériumok

// Kiemelkedő termőhely- és évjárat-stabilitás

A hibrid kiemelkedő alkalmazkodóképességgel rendelkezik, ezért stabilan teljesít különböző termőhelyeken, különböző környezeti feltételek és technológiai intenzitás mellett.

// Kiemelkedő stressztűrés

A hibridek hatékonyan viselik a kedvezőtlen termesztési körülményeket, így különösen jól tűrik az aszályt és a hőstresszt.

// Többéves tapasztalat

A ROBUST hibridek mögött kiterjedt nemesítési és fejlesztői háttér áll, megerősítve többéves üzemi megfigyelésekkel. Ez a tapasztalat garantálja, hogy a termelők számára biztonságos választást jelentsenek.



ROBUST HIBRIDEK:

DKC3972 // DKC4391 // DKC4712 // DKC5068 // DKC5075



MAXIMÁLIS HOZAM MAGAS STRESSZTŰRÉSSEL

Rendelkezhet egy hibrid magas hozampotenciállal – de ha nem ellenálló az adott területre jellemző stresszhatásokkal szemben, akkor nem fog megbízhatóan teljesíteni. A legjobb eredmény érdekében a FieldShield hibrideket úgy választjuk ki, hogy különböző környezeti feltételek mellett is képesek legyenek magas hozamot biztosítani. Olyan hibrideket választunk ki, amelyek bizonyítottan jól teljesítenek a kihívásokkal teli környezetben is.

Hogyan választjuk ki a FieldShield hibrideket?



LEGNAGYOBB KOCKÁZATÚ TERÜLETEK

Felmérjük a legfontosabb kockázatokat, amelyek a régiót leginkább érintik, például kórokozók, kártevők vagy időjárási tényezők.



DEKALB HIBRIDEK ÉRTÉKELÉSE

Kiválasztjuk a legnagyobb terméspotenciállal rendelkező hibrideket.



LEGNAGYOBB TOLERÁNCIÁVAL RENDELKEZŐ HIBRIDEK

A legjobb hibridek közül a legellenállóbb hibrideket választjuk ki, hogy megbízható teljesítményt nyújtsanak a nehéz körülmények között is.

Az adatok forrása:

- // Kísérlet a kisparcellás kísérletek különböző helyszíneken
- // Változó üzemi körülmények közötti vizsgálatok
- // Csőegészség vizsgálata mesterséges fertőzéses kísérletekben




FIELD SHIELD, A MINŐSÉG ZÁLOGA

Minden stressztípus esetében adatokat gyűjtünk az egyes hibridek viselkedéséről kísérleti és üzemi körülmények között. Ez lehetővé teszi, hogy a helyi feltételekhez legjobban illeszkedő hibrideket ajánljuk.

Melyek a fő stresszfaktorok, amelyek ellen a FieldShield hibridek hatékony megoldást nyújtanak?

Abiotikus stresszfaktorok	Magas kockázatú fenológiai fázis	Biotikus stresszfaktorok	Magas kockázatú fenológiai fázis
Hideghatás	BBCH 10-15	Fusarium graminearum	BBCH 63-69
Hőstressz	BBCH 63-69	Fusarium verticillioides	BBCH 63-69
Vízhiány	BBCH 63-69	Aspergillus flavus	BBCH 63-69
Szártörés	BBCH 18-63		

Növekedési szakaszok



**A LEGJOBB FIELD SHIELD
HIBRIDEK AZ ÖN SZÁMÁRA**
Keresse a teljes hibridportfóliót
a 78-79. oldalon!



A SZEMTERMÉS EGÉSZSÉGE

Használja ki a lehetőséget, hogy már a szezon elején javítsa az állomány egészségi állapotát!

A speciális FieldShield hibridek kevésbé fogékonyak a gombás betegségekre, és alacsonyabb mikotoxin-szintet biztosítanak a betakarított szemtermésben. A szemtermés egészségét sok tényező befolyásolja. A legnagyobb kockázat a szántóföldön jelentkezik, amelyet az időjárás vagy a különféle agrotechnikai gyakorlatok befolyásolnak.

Toxintermelő gombák és tüneteik

Hazánkban takarmánykukoricában leggyakrabban két toxin-értéket, a DON és aflatoxin értéket vizsgálják, de ha a tétel exportra vagy élelmezési láncba kerül, akkor több, egyéb toxin mennyiségének vizsgálata is szükséges. Kukoricán a legjelentősebb toxintermelő gombafajok a *Fusarium graminearum*, *Fusarium verticillioides* és *Aspergillus flavus*.

Fusarium fajok

Polifág, talajlakó, gyengültségi paraziták. Legyengült (hideghatás keléskor, tápanyag-utánpótlási hiányosságok, aszály hatására) és/vagy sérült növényeket képesek megfertőzni. Vetőmaggal, növényi maradványokkal terjednek. A növények valamennyi föld alatti és feletti részét fertőzik (csíranövény-pusztulást, szárkorhadást, csőpenészt okozva).



Fusarium graminearum

Tünete a cső hegyétől induló, akár az egész csövet befedő penészgyep, mely általában vörös vagy rózsaszín. A fertőzés kevésbé sérülésfüggő. Virágzáskor, mérsékelt meleg és csapadékos idő esetén, valamint a szemkitelítődés folyamán fertőzhet, amihez csapadékos és hűvösebb idő szükséges. Mikotoxinja a *DON toxin*.



Fusarium verticillioides

A csővön szétszórva található pelyhes felületű fehéres vagy rózsaszínes penészes „foltok”, pár szemet lefedő góccok jelennek meg. Jellemzően a sebzéseket (gyapottok bagolylepke, kukoricamoly, kukoricabogár, jégverés) fertőzi felül. A nővirágzás alatti (BBCH 63-69) száraz, meleg időjárás kedvező a fertőzéshez. Mikotoxinja a *fumonizin*.



Aspergillus flavus

Tünete a főleg a cső csúcsán vagy onnan kiinduló, szürkés-zöldes, „poros-fel-színű” penészgyep hosszanti irányban a szemek között. Gyengültségi parazita, jó kondíciójú növényeken nehezen vagy alig fertőz. Ha bajuszkitolástól késő lisztes érésig (BBCH 63-79) tartó száraz, hőstresszes időszak tapasztalható, akkor egyértelműen nagyobb toxintermeléssel kell számolnunk. Növényi maradványokon, magon áttelel, a szél, a kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke is terjeszti. Mikotoxinja az *aflatoxin*.

Toxinkockázat csökkentésére alkalmazható agrotechnikai elemek és hatásuk

TECHNOLÓGIA	HATÁS
Vetésváltás Kukorica elővetemény kerülése	NAGY
Szármaradványok bedolgozása Szakszerű tarlóművelés (tarlólántás, tarlóápolás), szükség esetén az elővetemény szármaradványainak csökkentése, aláforgatása, szárbontó készítmények alkalmazása	NAGY
Hibridválasztás Kevésbé fogékony FieldShield hibridek választása	KÖZEPES
Tápanyag-utánpótlás Általános növénykondíció javítása, túlzott N-adagolás kerülése	KICSI / KÖZEPES
Vetőmagcsávázás Csírákorai betegségek megelőzése, kezdeti fejlődés támogatása	KÖZEPES
Vetés Túl korai vetés, túl nagy vetésmélység kerülése	KÖZEPES
Gombaölőszeres védekezés A fuzáriózis elkerülése érdekében javasolt	KÖZEPES / NAGY
Kártevők elleni védekezés Növényi sérülések (fertőzési kapuk) mértékének csökkentése	KÖZEPES
Gyomszabályozás Gyommentes állomány biztosítása keléstől betakarításig	KICSI
Betakarítás és tárolás Megfelelő időben történő betakarítás, szárítás és betárolás megfelelő szemnedvesség-tartalommal, szellőztetés (Aspergillus flavus 14% nedvességtartalom felett fejlődik!)	KÖZEPES / NAGY


TŐSZÁM-OPTIMALIZÁLÁS A MAGASABB PROFITÉRT

Nem minden terület egyforma. A táblák közti, illetve a táblán belüli heterogenitás több forrásból eredhet: a talaj textúrája, szervesanyag-mennyisége, a termőréteg vastagsága, a tengerszint feletti magasság és a rendelkezésre álló vízkészletek mind befolyásolják az adott termőpotenciál zóna méretét és mértékét.

Jelentős költségek takaríthatók meg, ha egyes táblarészekben mérsékeljük az adott flexibilis csőtípussal rendelkező hibrid tőszámát, valamint nagy mértékben növelhető a profitabilitás, ha a magas termőpotenciállal rendelkező táblarészekben sűrítéssel aknázzuk ki egy fix csőtípussal rendelkező hibridben rejlő genetikai potenciált.

Annak érdekében, hogy kiválaszthassa az Ön igényeinek leginkább megfelelő hibridet és a hozzá tartozó tőszámajánlatunkat, 2025-ben az **ország számos pontján állítottunk be tőszámreakciós, mezoparcellás kísérleti helyszíneket**. Az adott kísérleti helyszín várható termésszintjétől függően 55.000 tő/ha-tól 125.000 tő/ha-ig alakítottunk ki parcellákat, melyeket ClimateFieldView-kompatibilis, hozamtérképes betakarítógéppel aratunk le és elemzünk ki.





Tábla-heterogenitásból hibridspecifikus töszámkijuttatási térkép

A hibridek közti töszámreakciós különbség rendkívül tág határok között mozog a várható termésszint és a hibrid csőflexibilitásának karaktere miatt. Ezen tulajdonság mélyebb vizsgálata történik a DEKALB Töszámreakciós Kísérleti Hálózatában (DIT), Európa számos országában, köztük Magyarországon is. Több mint 1500 hektáron zajlik évente a töszámreakciós tesztelés, ahol különböző termésszinteken vizsgáljuk a még bevezetés előtt álló hibridek profitmaximum pontját. A helyi körülményekről gyűjtött több ezer adatpont alapján történik a töszámajánlások évről-évre történő finomhangolása, illetve a ClimateFieldView adatbázisának frissítése. Magyarországon 2024-ben 16 helyszínről több mint 60.000 adatpont került rögzítésre.

Az alábbi ábra bemutatja, hogyan használhatja ki a különböző termőpotenciál zónáit a tábláiban a töszám optimalizálásával. A hagyományos megközelítés esetében egyetlen töszámértéket használ, függetlenül a tábla heterogenitásától, korlátozva a területekből kiaknázható termőpotenciált. Az egyes táblarészek hozamának maximalizálása érdekében, valamint a vetőmagköltségek optimalizálása végett, ajánlott a talajviszonyok változékonyságát a lehető legjobban kihasználni.



FIELDVIEW: TŐSZÁM ÉS TERMÉS

A FieldView segít **nyomon követni hibridjei teljesítményét**. A területi adottságoknak, valamint a kiválasztott hibridnek legmegfelelőbb tőszám meghatározásához pedig segítséget nyújt Önnek a **FieldView Seed Script**, azaz a vetési-kijuttatási tervező, melynek köszönhetően optimalizálhatja a vetendő mag mennyiségét a magasabb profit érdekében.

A **vetési-kijuttatási tervező** ötvözi a termőtábla adatait a DEKALB® tőszám-reakciós kísérleti hálózat hatalmas adatbázisával. A cél: rendkívül pontos és személyre szabott vetési norma meghatározása – mindez néhány perc alatt.

A DEKALB® hibridekkel, azok genetikai tulajdonságaihoz és a területi adottságokhoz igazított tőszámjavaslattal táblaszinten és zónánként is maximális profitot érhet el termőtábláin.

75 %

nyerési arány a fix tőszámhoz képest


0,82 t/ha

terméselőny a győztes helyszínek átlagában,
0,51 t/ha átlagban



+56.000 Ft/ha

extra profit a győztes helyszínek átlagában

12 helyszín, Magyarország, 2023-2024.



Az érzelmi alapú, „tradicionális” tőszám-meghatározás helyett válassza a FieldView vetési-kijuttatási tervezőjének adatbázisát és elemezze a DEKALB hibridek tőszámreakciós görbéit a megalapozott döntések meghozatala érdekében! A **FieldView adatbázisa alapján** egyedi, a területi adottságokhoz igazodó, **legmegfelelőbb vetőmagnormát határozhatja meg** területein az elérhető profit maximalizálása érdekében.



Az egyedi tőszámreakciók segítségével könnyedén **ellenőrizheti termőtábláin a kiválasztott DEKALB hibridek várható teljesítményét**, változó terméspotenciálú termőzónák esetében is, a jövedelmezőség érdekében.

Az összehasonlíthatósághoz, a változó tőszámú technológia profitelemzéséhez elengedhetetlen a (fix dózisú) kontroll parcellák megléte a termőtáblában. A **FieldView-ban a hozamok néhány kattintással könnyedén elemezhetőek**, összehasonlíthatóak.

TESTRE SZABOTT ÉS HATÉKONY NÖVÉNYVÉDELEM A TELJES SZEZON SORÁN

Minden év más és más, nem lehet a megszokásra alapozni a technológiát. Ezért van szükség egy erős, megbízható és rugalmas megoldásokról álló portfólióra. A növekedés kezdetén a növényeivel versengő gyomoktól a kártevőkön át a kórokozókig, a Bayernél bármilyen kihívásra talál hatékony készítményt. Célunk, hogy segítsünk Önnek, nemcsak megvédeni a termelésre fordított befektetését, hanem teljes mértékben kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket is.



Megoldásaink a kukorica növényvédelmi problémáira

acceleron®

Vetés

ADENGO®

ADENGO®
PLUS

LAUDIS

SIVANTO®
energy

PROPULSE®

PROSAR®

Decis®
FORTE

LAUDIS
PLUS

Deion®

Dicopur Top®

Aspect® T

3 levél

6 levél

8 levél

MONSOON

MONSOON®
active

MONSOON®
active plus

* A Dicopur Top a Nufarm bejegyzett márkaneve.



KIZÁRJUK A GYOMOKAT A VERSENYBŐL

ADENGO>>>

A korai gyomosodás jelentősen befolyásolja a termés mennyiségét, ezért érdemes a lehető legkorábban kiiktatni a gyomkonkurenciát. Ebben kiváló partner az **Adengo**, amely preemergensen vagy korai posztemergensen is kijuttatható. A levélen keresztüli hatás mellett megújuló, talajon keresztüli aktivitással biztosítja a gyommentes állomány elérését a teljes vegetációs időszakban. Mindezt a kultúrnövény károsodása nélkül, a benne lévő széfelemeknek köszönhetően. A magról kelő egy- és kétszikű gyomok széles spektruma ellen hatékony. A megfelelő talajon keresztüli hatáshoz a kijuttatás utáni 2-3 héten belül 15-20 mm csapadék szükséges.



- // A korai gyomkikapcsolás kiváló eszköze
- // Megújuló tartamhatás talajon keresztül
- // Élő fenyércirok magról kelő egyedeit hatékonyan pusztítja, a rizomás alakokon pedig erősen növekedésgátló hatású, szulfonil-karbamid-rezisztens egyedek esetén is

ADENGO>>> PLUS

Az **Adengo Plus** csomag egy könnyen, rugalmasan alkalmazható, széles spektrumú, korai posztemergens megoldás. A csomag tartalmazza az Adengo-t a megfelelő kombinációs partnerrel, a Delion-nal (dikamba). A két termék kombinációja a nehezen irtható kétszikű gyomok ellen is biztos hatékonyságot nyújt.



- // Teljes megoldás takarmánykukorica gyomirtásához
- // Korai posztemergens kijuttatás
- // Megnövelt hatékonyság és szélesebb spektrum



A **Laudis** kukoricában széles körben felhasználható, a kultúrnövény 3-8 leveles fejlettsége között. A magról kelő egy- és kétszikű gyomok széles spektruma ellen hatékony. A növénybe gyorsan felszívódik és kevesebb mint 1 óra alatt esőállóvá válik. Napsütéses időben látványosan gyors hatás jellemzi. A kukoricatermesztés minden szegmensében (takarmány-, csemege-, vetőmag- és pattogatni való kukorica) felhasználható.



- // Sorkezelésre is felhasználható
- // Rugalmasan kijuttatható a kultúrnövény károsodása nélkül
- // A fenyércirok rizómás alakját (szulfonil-karbamid-rezisztens egyedek esetén is) is képes átmenetileg teljesen kifehéríteni, hetekre visszafogja a fejlődését.



A **Laudis Plus** csomag a tökéletes posztemergens gyomirtás legmegfelelőbb eszköze. A csomagban a Laudis hatékonyságát és egyedülálló tulajdonságait a Delion (dikamba) egészíti ki, biztosítva a még szélesebb hatásspektrumot. Használatával látványosan gyorsan és a kukorica károsodása nélkül tisztíthatjuk meg az állományt a gyomoktól, a maximális termésmennyiség elérése érdekében.



- // Tökéletes és gyors posztemergens megoldás takarmánykukorica gyomirtásához
- // Erőteljesebb hatékonyság és még szélesebb hatásspektrum
- // Széfener biztosítja a maximális szelektivitást a kultúrnövényre, nemcsak a Laudis, hanem a Delion hatóanyagának esetében is



További posztemergens megoldások

Minden termékünk tartalmaz széfenert, ami biztosítja a teljes szelektivitást a kultúrnövényre a maximális termésmennyiség elérése érdekében.



A **Capreno**-val eredményesen védekezhetünk minden jelentős magról kelő egy- és kétszikű gyom ellen. Levél- és talajon keresztüli hatásának köszönhetően a teljes vegetáció alatt tisztán tartja az állományt. Felhasználható a kukorica 3-6 leveles fenológiai állapota között. A megfelelő hatékonyság érdekében a készítményt **Mero** tapadásfokozó segédanyaggal kell kiegészíteni.



- // Kiemelkedő gyomirtó hatás
- // Szezonhosszú hatástartam
- // Két eltérő hatásmódú hatóanyag
- // Széles egy- és kétszikű hatásspektrum



A **Monsoon** használata egyszikű gyomokban túlsúlyos területre ajánlott. Rendkívül széles egyszikű spektruma mellett számos magról kelő kétszikű gyom ellen is hatékony. Tarackbúza és rizómás fenyércirok ellen a legmagasabb dózisban kell alkalmazni. Kijuttatható a kukorica 3-7 fejlettsége között.



- // Egyszikű specialista
- // Számos magról kelő kétszikű gyom ellen is hatékony
- // Rugalmasan kijuttatható

MONSOON[®] active

A **Monsoon active** kimagasló hatékonysággal bír az egyszikű gyomok ellen. Hatása nemcsak a magról kelő egyszikű gyomokra terjed ki, hanem a rizómás egyedeket (fenyércirok, tarackbúza) is eredményesen tudjuk vele irtani. Mindezek mellett kifejezetten széles kétszikű spektrummal is rendelkezik. Teljes értékű gyomirtási megoldást nyújt a kukorica 3-7 leveles állapota között kijuttatva, a gyomok fejlettségéhez igazítva.



MONSOON[®] active plus

A 2026-os szezonban a termék már csomag formájában is elérhető. A **Monsoon active Plus** csomagban a Delion teljesíti ki a Monsoon active kétszikűek elleni hatását.

- // Megbízható megoldás egy- és kétszikű gyomok ellen
- // Fenyércirok és tarackbúza ellen is kiváló hatékonyság
- // Hosszú hatástartam



Toxinkockázat csökkentése

A magas toxintartalom megelőzésének legjobb módja, ha a fertőzésnek utat nyitó kártevő rovarok, valamint a toxintermelő gombák ellen is védekezünk.



A **Decis Forte** kipermetezésével egyedülálló módon 12,5 g deltametrin hatóanyagot juttatunk ki, ami az eddig megszokott deltametrin-dózisok több mint másfélszerese. Ennek akkor van jelentősége, amikor például a gyapottok bagolylepke lárvái a bibeszálak közt megbújva csak töredék hatóanyaggal érintkeznek. A kizárólag Lepidoptera (kukoricamolym, gyapottok bagolylepke) lárvákra ható készítményekkel szemben a Decis Forte az amerikai kukoricabogár kifejlett egyedei ellen is hatékony.



- // Magas hatóanyag-tartalom
- // Gyors taglózó hatás
- // A kukorica kártevőinek széles spektruma ellen hatékony



A **Sivanto Energy** felszívódó és kontakt hatóanyagot is tartalmaz. A két eltérő hatásmód mindamellett, hogy a rezisztencia-kezelés kiváló eszköze, jobb hatékonyságot és szélesebb hatásspektrumot tesz lehetővé. Kukoricában felhasználható a kukoricamolym, a gyapottok bagolylepke és az amerikai kukoricabogár ellen, valamint a szívó kártevők elleni kiváló hatékonysága révén eredményesen védekezhetünk a levéltetvek ellen is.



- // Felszívódó és kontakt hatóanyagok kombinációja
- // Rugalmas kijuttathatóság
- // Alacsonyabb rezisztencia-kockázat



A **Prosaro** nemcsak a kalászosokban, hanem kukoricában is megbízható partner a Fusarium fajok ellen, két triazol-hatóanyag kombinációjával erős védelmet biztosít. A készítmény 3 szárcsomós állapottól virágzás végéig felhasználható takarmány-, siló-, vetőmag- és pattogatni való kukoricában.



- // Megbízható védelem a csőpenész ellen
- // Két felszívódó hatóanyag kombinációja

PROPULSE[®]

A **Propulse** kombinált hatóanyagai a gombák széles köre ellen nyújtanak védelmet. A Propulse rugalmas kijuttatási időintervallumban nyújt lehetőséget a védekezésre, szármegnyúlástól egészen virágzás végéig használható.



- // Csemege- és pattogatni való kukoricában is felhasználható
- // Két eltérő hatásmódú hatóanyag





ELLENÁLLÓ HIBRIDEK, BÁRMELY KIHÍVÁSRA

A DEKALB® a hazai kukoricatermesztéssel összefonódott népszerű márka, mely a legnagyobb terméspotenciállal és kiváló termésstabilitással rendelkező hibrideket foglalja magába. Aki DEKALB-ot vet, biztosan „gondos gazdája” területeinek, miközben figyelmet fordít a folyamatos fejlődésre és alkalmazkodóképességre.







DKC3513

Másodvetésű, nagyon korai siló

FAO 280-290



SILÓ ZÖLDHOZAM



EGÉSZSÉGES TERMÉS



KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	igen-korai
Aszáztűrő képesség	kiváló
Korai fejlődési erély	kirobbanó
Gyökérerősség	jó
Szárerősség	jó
Növénymagasság	magas
Virágzási idő (érés csoporton belül)	kései
Zöldhozam	★★★★★
Száraz hozam	★★★★☆
Zöldszáron érés	★★★☆☆
Sejtfal emészthetőség	★★★★☆
Energiatartalom	★★★★★
Növényegészség	★★★★★

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Korai fejlődési erélye és hidegtűrése kiemelkedő, azonban minimum 10°C talajhőmérséklet szükséges az egyenletes kelés biztosítása érdekében.
- Magas várható termésszint esetén meghalálja a tözsűrűsítést, de átlagos és gyengébb körülmények esetén is kiválóan kompenzál.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik egy rövid tenészciklusú, robusztus, nagy zöldtömeget nevelő silóhibridet keresnek, melynek kiváló zöldhozama mellett magas az emészthető keményítő- és energiatartalma.



/// DKC3513, Kojetín, Csehország, 2023



/// DKC3513, Kojetín, Csehország, 2023



/// DKC3513, Kojetín, Csehország, 2023


TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

DEKALB fejlesztési kísérletek átlaga



/// 5 csehországi fejlesztési kísérlet átlaga, 2023

„Nagy zöldhozammal és magas keményítő-tartalommal rendelkező, korai silóhibridet keres? A DKC3513-at javaslom, mely 3 éve bizonyít a csehországi termőterületeken. Kiváló hidegtűrésével és korai fejlődési erélyével a korán vethető kukoricák közé sorolható, de másodvetésű silóként is alkalmazható június elejéig történő vetésig. Kísérleti eredményeink alapján mind a tejtermelő gazdaságokban, mind a biogáz-előállításban kiváló választás, magas energiatartalma miatt.”



ONDREJ CERNY

/// Bayer Crop Science
Solution Technical
Assesment Manager



DKC3972

Bírja a strapát

FAO 290-310



TERMÉSZTABILITÁS



TERMŐKÉPESSÉG



HIDEGTŰRÉS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	igen-korai
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	jó
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	jó
Gyökérerősség	jó
Szárerősség	jó
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	korai
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- Flexibilis csőtípusának köszönhetően alacsonyabb tőszámon termesztve is képes a magas termés elérésére.
- Termésstabilitása és aszálytűrése miatt az átlagos vagy gyengébb termőhelyekre is kifejezetten ajánljuk.
- Rugalmasan illeszthető a vetésforgóba, hiszen korai betakarítása után időben vethetők az őszi gabonafélék.
- Másodvetésre is alkalmas.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik átlagos vagy gyengébb termőhelyekre keresnek stabilan jól termő hibridet az igen korai éréscsoportban.



/// DKC3972, Máriapócs, 2023



/// DKC3972 (bal), Versenytárs (jobb), Mosonmagyaróvár, 2024




/// DKC3972, Máriapócs, 2023

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// DEKALB fejlesztési és értékesítői kísérletek, 2020

5 hónap vegetáció alatt is képes 10 tonnás hozamra!
Szeptemberi aratás* 10 tonna felett



/// DEKALB fejlesztési és értékesítői kísérletek, 2020

„A DKC3972 az igen-korai éréscsoport kiváló tagja. Tökéletes azoknak, akik egy igazi flexibilis hibridet keresnek. Gabona előveteményként és kései vetés esetén is jó választás rövid tenészsídjének köszönhetően. Rugalmasságát bizonyítja gyengébb és közepes adottságú termőterületeken is. Kimagasló terméseredményt érhetünk el vele akár alacsony töszám mellett is.”



KOVÁCS NIKOLETTA

/// Bayer Crop Science
Régióvezető



DKC4109

Rugalmasságban bajnok

FAO 310-320



TERMÉSZTÁBILITÁS



ERŐS GYÖKÉR ÉS SZÁR



HIDEGTŰRÉS

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Magas várható termésszint esetén meghalálja a tőszámsűrítést, de átlagos és gyengébb körülmények esetén is kiválóan kompenzál.
- Korai fejlődési erélye és hidegtűrése kiemelkedő, azonban minimum 10°C talajhőmérséklet szükséges az egyenletes kelés biztosítása érdekében.

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	igen-korai
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	nagyon jó
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	kirobbanó
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	átmeneti

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik kiemelkedő terméshozamot szeretnének elérni korai betakaríthatóság mellett is, időt hagyva az őszi vetések előtti talajmunkákra.



/// DKC4109, Dalmand, 2023



/// DKC4109, Gyékényes, 2020



/// Mosonmagyaróvár, 2022

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

DEKALB fejlesztési kísérletek átlaga aszályos évjáratban

A DKC4098 és a DKC4109 a fejlesztési kísérletekben



/// 8 magyarországi fejlesztési kísérlet átlaga, 2022

„A DKC4109 egy korán vethető, kiváló korai fejlődési eréllyel és szárstabilitással rendelkező, megbízható igen-korai hibrid. Korán betakarítható, egészséges termést adó kukorica lévén kalászos előveteményként ajánlom a stabilitást, és kiszámíthatóságot előtérbe helyező gazdák számára.”



FRÖHLICH BENJÁMIN

/// Bayer Crop Science
Agronomist Lead, Seeds



DKC4125

Rekord kimagasló szemminőséggel

FAO 310-330



ASZÁLYTŰRÉS



TERMŐKÉPESSÉG



EGÉSZSÉGES TERMÉS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	igen-korai
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	erőteljes
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	★★★★★
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Kiváló stressztűrő képességének, termőhely- és évjárat-stabilitásának köszönhetően minden talajtípuson, kitettebb területeken is eredményesen termesztendő.
- Kiváló termésstabilitása miatt kifejezetten ajánljuk olyan táblákra, ahol az évjáráthatás jelentősen befolyásolja a termést. Kitettebb helyeken is sikeresen termesztendő.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik új nemesítésű, korai érésű kukoricát keresnek kiváló aszály- és stressztűrő képességgel párosulva, illetve fontos számukra a kiváló egészségprofil és a magas hektolitertömeg.



/// DKC4125, Vashosszúfalu, 2023



/// DKC4125, Vashosszúfalu, 2023




/// DKC4125, Máriapócs, 2023

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// 85 közép-kelet európai Bayer fejlesztési kísérlet átlaga, 2021-2023.

„A DKC4125 egy kiváló FAO 320-as érésidejű hibrid, mely eltérő évjáratokból származó eredmények alapján egy kiváló évjárat- és termőhely-stabilitással rendelkező hibrid. Ez a hibrid nagyszerű választás, függetlenül attól, hol kívánja elvetni.”



SLAVKO SPASOJEVIC

/// **Bayer Crop Science**
Solution Technical
Assessment Manager



DKC4231

Bírja a hőséget

FAO 320-330



ASZÁLYTŰRÉS



TERMŐKÉPESSÉG



CSŐFLEXIBILITÁS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	korai
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	erőteljes
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	korai
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Kiváló stressztűrő képességének, termőhely- és évjárat-stabilitásának köszönhetően minden talajtípuson, kitettebb területeken is eredményesen termesztendő.
- Kiváló termésstabilitása miatt kifejezetten ajánljuk olyan táblákra, ahol az évjáráthatás jelentősen befolyásolja a termést. Kitettebb helyeken is sikeresen termesztendő.
- Korai fejlődési erélye és hidegtűrése kiemelkedő, azonban minimum 10°C talajhőmérséklet szükséges az egyenletes kelés biztosítása érdekében.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik egy klasszikus DEKALB megjelenésű, korai, stresszes viszonyok között is megbízható, magas terméspotenciállal rendelkező hibridet keresnek.



/// DKC4231, Várong, 2024



/// DKC4231 (bal), Versenytárs (jobb)
Mosonmagyaróvár, 2024




/// DKC4231, Regöly, 2024

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// Hazai terméseredmények, 2023



/// 46 közép-kelet európai fejlesztési kísérlet átlaga, 2022-2023

„A DKC4231 új mérce a stressztolerancia és a változékony környezeti feltételekhez való alkalmazkodóképesség tekintetében. A hibrid kifejezett előnye a stabilitása, melynek köszönhetően ideális feltételek mellett magasan, az éréscsoportjának átlaga felett teljesít, azonban kedvezőtlen körülmények esetén kevésbé hajlamos a termésdepresszióra. Éréscsoport tekintetében korai, termőképesség szempontjából viszont a közép-korai csoport élmezőnyébe tartozó, flexibilis csőtípusú hibrid. A jól ismert DKC4351 méltó utódként ideális választás azoknak, akik egy kiemelkedő szárazságtűréssel rendelkező korai hibridet keresnek, de nem szeretnék lemondani a magas terméspotenciálról sem.”



KÖKENY GÁBOR

/// Bayer Crop Science
Agronomist



DKC4253 ^{ÚJ}

Korai frenetikus

FAO 320-330



TERMŐKÉPESSÉG



TERMÉSZTABILITÁS



KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	korai
Termőképesség	💡 💡 💡 💡 💡
Aszálytűrő képesség	nagyon jó
Termőhely-stabilitás	nagyon jó
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	kirobbanó
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	kései
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	💡 💡 💡 💡 💡
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Átlagos vagy afeletti termőpotenciállal bíró területek hibridje, mely klasszikus magyarországi töszámviszonyok mellett tud igazán kiemelkedni.
- Korai fejlődési erélye és hidegtűrése kiemelkedő, azonban a minimum 10 °C-os talajhőmérséklet szükséges az egyenletes kelés biztosítása érdekében.
- Az erős gyökérzetének és stabil szárának köszönhetően ellenáll a legtöbb negatív környezeti hatásnak.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik a korai érés csoportban keresik a legnagyobb termőpotenciállal rendelkező, új genetikát, mely kiváló csőflexibilitással és csőegészséggel rendelkezik.



/// DKC4253, Mosonmagyaróvár, 2025



/// DKC4253, Mosonmagyaróvár, 2025




/// DKC4253, Debrecen, 2025

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// 7 magyarországi Bayer fejlesztési kísérlet átlaga, 2024.

„A 2024-es fejlesztői és nemesítői kísérletek abszolút győztes hibridje az igen-korai éréscsoportban a DKC4253. Korai vetésre is alkalmas, alacsony töszámon is jól kompenzáló hibrid, mely küllemre sosem fogja a legszebb csöveket mutatni, de akinek a mérleg számít, imádni fogja!”



FRÖHLICH BENJÁMIN

/// **Bayer Crop Science**
Agronomist Lead, Seeds



DKC4391

Korai kedvenc

FAO 320-340



ASZÁLYTŰRÉS



TERMŐKÉPESSÉG



TERMÉSSZABILITÁS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	korai
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	nagyon jó
Termőhely-stabilitás	nagyon jó
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	★★★★★
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- Kiváló stressztűrő képességének, termőhely- és évjárat-stabilitásának köszönhetően minden talajtípuson, kitettebb területeken is eredményesen termesztendő.
- Az erős gyökérzetnek és a stabil szárnak köszönhetően ellenáll a legtöbb negatív környezeti hatásnak.
- A gyors vízleadása segíti a betakarítás jobb ütemezését, illetve jelentős költségmegtakarítást érhetünk el a hibrid segítségével.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik kiemelkedő alkalmazkodóképességet és általános stressztoleranciát, azaz biztonságos kukoricatermesztést szeretnének megvalósítani korán lekerülő, magas terméssel.



/// DKC4391, Bozzai, 2020



/// DKC4391, Sárbogárd, 2020



/// DKC4391, Hajdúböszörmény, 2020

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TŐSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2022

FAO 300



„A DKC4391 hibrid egyesíti magában a korai érés és a magas terméspotenciál előnyeit. Flexibilitása lehetővé teszi, hogy változatos termőhelyi viszonyok között is kiemelkedő teljesítményt nyújtson, legyen szó akár kiváló, akár gyengébb adottságú területekről. Ajánlom ezt a hibridet azoknak, akik a hatékonyság és a megbízhatóság optimális egyensúlyát keresik a kukoricatermesztésben.”



POLGÁRI CSABA

/// Bayer Crop Science
Sell-out Development Lead &
Agronomist Lead, Cereal



DKC4391WX

Szintlépés az elődhöz képest

FAO 330-350



STRESSZTÜRÉS



CSÖFLEXIBILITÁS



GYORS VÍZLEADÁS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	korai
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	nagyon jó
Termőhely-stabilitás	nagyon jó
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Korai vetésre érzékeny, minimum 10°C-os, stabil talajhőmérséklet esetén kezdhető a vetés.
- Átlagos vagy a feletti termőpotenciállal bíró területek hibridje, mely klasszikus magyarországi tőszámviszonyok mellett tud igazán kiemelkedni.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik megbízható, stabil, korai waxyhibridet szeretnének termesztetni, mely kiváló termőképességgel rendelkezik, és aszályos évjáratban sem hagy cserben. Az alapváltozathoz képest speciális keményítő-összetételű hibrid, mely amilopektin/amilóz arányában különbözik.



/// DKC4391WX, Balatonfőkajár, 2024



/// DKC4391WX, Letenye, 2024



/// DKC4391WX, Balatonfőkajár, 2024

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TŐSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

WAXY (VIASZOS) KUKORICA

Magyarországon a teljes kukorica vetésterületnek csupán néhány százalékán termesztenek waxy kukoricát. Az elnevezés onnan ered, hogy a **kukoricaszemek viaszos levet engednek, amikor elvágjuk azokat**. A waxy kukorica az ipari keményítő előállítás egyik fontos alapanyaga, a belőle gyártott speciális keményítő rendkívül nagy viszkozitású és tapadós. **Felhasználása igen szerteágazó**, hiszen élelmiszer-adalékként, papír-, textil- és gyógyszergyártáshoz is alapanyagként szolgál.

A keményítők a növényvilágban elterjedt tartalék-tápanyagok, amelyek lebontásával szervezetünk energiához jut. A hagyományos kukoricafajták jellemzően amilopektin és amilóz típusú keményítőket tartalmaznak 75-25%-os arányban. 1909-ben fedezték fel, hogy a waxy kukorica egyedülállósága abban rejlik, hogy a mag endospermiumában a szokásostól eltérő módon ez az arány közel 100% az amilopektin javára. A két keményítő fajta a szerkezetében és molekulatömegében tér el egymástól, ami a táplálkozási és fiziológiai tulajdonságaival is összefügg. A **waxy kukoricából nyert keményítő felszívódása lényegesen lassabb, mint az egyszerű cukroké, lassabban** emeli a vércukor- és inzulinszintet. A lassú felszívódásnak köszönhetően **a szervezet hosszabb időn át nyer energiát** és kevésbé van rákényszerítve arra, hogy ezt más molekulákból állítsa elő. Felhasználása a sportolók körében azután vált népszerűvé, hogy a takarmányozásban megfigyelték, hogy jótékonyan hat a használatok súlygyarapodására is.

A termesztés során a kukoricatáblák elhelyezésénél **ügyelni kell a megfelelő izolációs távolság betartására** és az átporzás elkerülésére. Legalább 200 méter izolációt kell tartani a hagyományos kukoricatábláktól, melyekhez képest kb. 3-10%-kal alacsonyabb hozamra képes. A waxy kukoricát **kíméletesen kell száritani**. A szárítás hőmérséklete nem haladhatja meg a 70 °C-ot a termés hőmérséklete pedig a 60 °C-ot.



DKC4433

Stresszben partner

FAO 340-360



ASZÁLYTŰRÉS



TERMÉSZTABILITÁS



STRESSZTŰRÉS

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Kiváló stressztűrő képességének, termőhely- és évjárat-stabilitásának köszönhetően minden talajtípuson, kitettebb területeken is eredményesen termesztethető.
- Kiváló termésstabilitása miatt kifejezetten ajánljuk olyan táblákra, ahol az évjáráthatás jelentősen befolyásolja a termést. Kitettebb helyeken is sikeresen termesztethető.

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	korai
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	nagyon jó
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	kései
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	fix

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik nem szeretnek kockáztatni, az elérhető legnagyobb termésbiztonságot nyújtó korai hibridet keresik, mely felveszi a kesztyűt a stresszhatásokkal. Egyik legújabb nemesítésű mestermunka az éréscsoportjában, mely gyors vízleadással és kiváló csőegészséggel párosul.



/// DKC4433, Vashosszúfalu, 2023



/// DKC4433, Regöly



/// DKC4433, Sárbogárd, 2023

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TŐSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2023

FAO 300-399



„A DKC4433-mat olyan körülmények közé javaslom leginkább, ahol nagyon heterogén táblákon, termőpotenciál zónákon alapuló tőszámkijuttatási terv alapján történik a vetés. A hibrid fix típusú csőkarakterisztikája miatt a jobb táblarészekeken igényli a tőszám sűrítését, ezáltal kiválóan leköveti a tábla heterogenitásából eredő szélsőséges tőszámváltoztatásokat is. Ezen karakterisztika velejárója a kiemelkedő aszály- és stressztűrő képesség és a kiváló agronómiai csomag.”



FRÖHLICH BENJÁMIN

/// Bayer Crop Science
Agronomist Lead, Seeds



DKC4533

Verhetetlen

FAO 350-360



TERMŐKÉPESSÉG



TERMÉSTABILITÁS



TERMŐHELY-STABILITÁS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép-korai
Termőképesség	🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 +
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	kirobbanó
Gyökérerősség	jó
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 +
Csőflexibilitás	átmeneti

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Kiváló stressztűrő képességének, termőhely- és évjárat-stabilitásának köszönhetően minden talajtípuson, kitettebb területeken is eredményesen termesztendő.
- Magas várható termésszint esetén meghalálja a tőzsámsűrítést, de átlagos és gyengébb körülmények esetén is kiválóan kompenzál.
- Kiváló szár- és gyökérerősségének köszönhetően megkésett betakarítás esetén sem kell tartanunk megdőléstől.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik a korai érés csoport legnagyobb terméspotenciáljával rendelkező, legújabb hibridjét kívánják elvetni. Kiváló hektolitertömegének köszönhetően meglepően magas terméseredmény társul az alacsony, kevés biomasszát nevelő megjelenéséhez képest.



/// DKC4533, Nagyatád



/// DKC4533, Ászár




/// DKC4533, Bak

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// Hazai terméseredmények, 2023



/// 18 magyarországi fejlesztési kísérlet átlaga, 2024.

„A DKC4533-mal egy igen magas terméspotenciállal és termőhely-stabilitással rendelkező hibrid érkezett a DEKALB portfólióba. 2024-es farmer demókban rendre az élvezőnyben végzett, legyen szó igen jó adottságú területről és akár 12 tonnás vagy afölötti természintről, vagy szárazabb, kitettebb termőhelyről és 7-8 tonnás természintről - Zalától Hajdú-Bihar megyéig. Kompakt, zömök megjelenése, magas hektolitertömege megfelel a termelők új elvárásainak. Korai tenyészideje ellenére a legmagasabb természinrt várhatjuk tőle.”



RADÁNY PÉTER

/// **Bayer Crop Science**
Regionális Értékesítési Koordinátor
Nyugat-Magyarország



DKC4712

Csősúlyban verhetetlen

FAO 350-370



TERMŐKÉPESSÉG



CSŐFLEXIBILITÁS



STRESSZTŰRÉS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép-korai
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	nagyon jó
Évjárat-stabilitás	jó
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	jó
Szárerősség	átlagos
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Átlagos vagy a feletti termőpotenciállal bíró területek hibridje, mely klasszikus magyarországi tőszámviszonyok mellett tud igazán kiemelkedni.
- Korai vetésre érzékeny, minimum 10°C-os stabil talajhőmérséklet esetén kezdhető a vetés.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik nem preferálják a tőszámsűrítést és kifejezetten attraktív, nagy csövek látványát kedvelik. Egyik legújabb nemesítésű mestermunka az éréscsoportjában, terméspotenciálja csúcskategóriás, mely gyors vízleadással és kiváló csőegészséggel párosul.



/// DKC4712, Regöly, 2023



/// DKC4712, Sárbogárd, 2021



/// DKC4712, Sárovar, 2020

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

Korai érésű hibridek eredménye


TOP10



/// Magyar Kukorica Klub, 2022

Extrém csőflexibilitás

Kiváló kompenzációs képesség alacsony tőszámon



/// 53 magyarországi fejlesztői tőszámreakciós kísérlet átlaga
8 t/ha termésszinten, 2022 (6000 adatpont)

„A hazai legnépszerűbb éréscsoport (FAO 300 vége) új szereplője, mely terméspotenciálja és kiemelkedő csőflexibilitása miatt hamar oszlopos tagja lesz a DEKALB portfóliónak. A megfontolt, objektív gondolkodású, termésbiztonságot előtérbe helyező gazdák számára nyújt kiváló megoldást.”



FRÖHLICH BENJÁMIN

/// Bayer Crop Science
Agronomist Lead, Seeds



DKC4897

Legyőzi a stresszt

FAO 390-400



STRESSZTŰRÉS



ASZÁLYTŰRÉS



ERŐS GYÖKÉR ÉS SZÁR

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép-korai
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	nagyon jó
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	erőteljes
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	átlagos
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	★★★★☆
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- Aszály- és stressztűrésének köszönhetően kedvezőtlenebb évjáratokban is jól teljesít.
- Erős szárának és gyökérzetének köszönhetően megkésett betakarítás esetén sem kell tartanunk megdőléstől.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik kedvelték a DKC4943 évjárat- és termőhely-stabilitását, de nyitottak kipróbálni egy új genetikát és magasabb termésszintet a DKC4897 személyében. Ez a hibrid méltó utódja a DKC4943-nak.



/// DKC4897, Murakeresztúr, 2023



/// DKC4897, Dalmand, 2023



/// DKC4897, Regöly, 2023

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TŐSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2022

FAO 400



2022. évi IKR Agrár kukorica kísérletek győztese 50 fős mezőnyben!

„A DKC4897 hibrid a nemesítés eddigi legnagyobb sikere, terméspotenciálja megbízhatóan a legjobb. Kiváló paramétereivel jól illeszthető a magas tudást igénylő, színvonalas gazdálkodásba. Kiváló termőhely- és évjárat-stabilitással rendelkezik. Kelési erélye kiemelkedő, 2-3 nap alatt egyöntetű, egészséges állományt képez. Erős szárral és gyökérrel rendelkezik. A hibrid hőösszeg hasznosítása kiemelkedő, biztosítva a kedvező virágzást, fiziológiai érést, szárazanyagbeépülést és vízleadást. Az egyöntetű növényállomány, a jó megtermékenyülés, a kukoricaszemek teltsége, fejlettsége, kedvező ezerszem tömege garantálja a kimagasló terméseredményt.”



PROF. DR. NAGY JÁNOS

/// **Debreceni Egyetem**
Professor emeritus



DKC5092

Zömök bajnok

FAO 380-410



TERMÖKÉPESSÉG



TERMÉSSZABÍLYS



GYORS VÍZLEADÁS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép-korai
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	nagyon jó
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	jó
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	★★★★★
Csőflexibilitás	átmeneti

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- Kiváló termőhelyen történő vetés esetén meghalálja a tözsámsűritést, mely erős szára miatt nem jelent kockázatot.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik a szemes kukorica termesztését nem a zöldtömegének mennyiségére, hanem a csövek méretére alapozzák. Megjelenése ellenére kimagasló terméspotenciálja és gyors vízleadása miatt fog pozitív meglepetést okozni.



/// DKC5092, Murakeresztúr, 2023



/// DDKC5092, Murakeresztúr, 2023



/// DKC5092, Letenye, 2021

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TŐSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2023

FAO 400-499



I. 2023 IKR Agrár Kft.,
Fejlesztői kísérletek,
Középerésű csoport



II. 2023. GOSZ-VSZT-NAK
Posztregisztrációs fajtakísérlet,
Középerésű csoport

Miért lett a DKC5092 az egyik kedvenc kukorica hibridem? Nos, könnyű erre választ adnom, hiszen ez a hibrid tenyésztésénél, agrotechnikai tulajdonságainál és teljesítőképességénél fogva is a hazai körülmények között leginkább óhajtott hibrid. Agrotechnikai tulajdonságai közül korai fejlődési erélye ugyan csak átlagos, de a továbbiakban növekedése és fejlődése nagyon egyenletes és intenzív. Szárazsúlárdsága – köszönhetően közép magas termetének és csőelhelyezkedésének – rendkívül erős, megdőlésre egyáltalán nem kell számítani. Csövei hengeresek, nagyok, a hosszú szemek biztosítják a kiváló szem-csutka arányt. Teljesítőképességéről az IKR Agrár Kft. nagyüzemi kísérleti hálózatában 2019-től szerzett eredményei tanúskodnak.

Az évenkénti 7, illetve 8 termőhely átlagában elért, sorrendben 11,86 t/ha, 13,72 t/ha, 8,99 t/ha, illetve 10,61 t/ha összesített termésátlag a vizsgált 40, 43, 50 és 44 hibrid viszonylatában a termésrangsor 1., 3., 9., és 6. helyezésére volt elegendő, de 2 évben is (2019-ben és 2023-ban is!) éréscsoportjának 1. helyezettje lett.



DR. KISS ERZSÉBET

/// IKR Agrár Kft.
Fejlesztési tanácsadó



DKC5075

A nagy visszatérő

FAO 400-420



EXTENZÍV TERÜLETEKRE IS



EGÉSZSÉGES TERMÉS



ASZÁLYTŰRÉS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	jó
Évjárat-stabilitás	jó
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	korai
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	fix

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- A sikeres termesztéshez nem igényel az átlagosnál jobb termőhelyet és kiemelkedő technológiai színvonalat.
- Fix csőtípusa következtében, kiváló termőhelyen történő vetés esetén meghálálja a tözsűsítést, mely erős szára miatt nem jelent többletkockázatot.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik átlagos és extenzív területekre keresnek jól termő hibridet, amely akár aszályos körülmények között is jól teljesít.



/// DKC5075, Pusztaszabolcs, 2020



/// DKC5075, Bögöte, 2020




/// DKC5075, Murakeresztúr, 2021

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



„A növény egész habitusa, megjelenése a stressztűrő képességről, illetve a töszám növelésének lehetőségéről árulkodik (erektív levélállás, fix csőtípus). Termőképeségével kiemelkedik a középérésű csoport hibridjei közül, minden termesztési környezetben. Nem okozhat csalódást!”



SLAVKO SPASOJEVIC

/// Bayer Crop Science
Solution Technical
Assessment Manager



DKC4933

Szintlépés a kukoricatermesztésben

FAO 410-430



TERMŐKÉPESSÉG



ASZÁLYTŰRÉS



TERMÉSSZABILITÁS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	kései
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Magas várható termésszint esetén meghalálja a tőzsámsűrítést, de átlagos és gyengébb körülmények esetén is kiválóan kompenzál.
- Korai fejlődési erélye és hidegtűrése kiemelkedő, azonban a minimum 10°C talajhőmérséklet szükséges az egyenletes kelés biztosítása érdekében.
- Kitűnő vízleadásának köszönhetően jelentős lehet a szárítási költség-megtakarítás.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik a FAO400-as éréscsoport legütőképesebb új hibridjét keresik. Óriási terméspotenciál, gyors vízleadás és rendkívüli aszály- és stressztűrő képesség.



/// DKC4933, Vashosszúfalu, 2023



/// DKC4933, Kerta, 2023




/// DKC4933, Pölöskefő, 2023

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TŐSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// 18 magyarországi fejlesztési kísérlet átlaga, 2024

„A DKC5092-öt a 2022-es rendkívül aszályos évjáratban legyőzni óriási teljesítmény! Ez a hibrid képes volt erre, sőt 16 tonna fölötti termésszinten is bizonyított flexibilis csőtípusa és FieldShield karaktere révén. Minden kukoricatermesztő gazda számára ajánlom, mert ez a vadonatúj nemesítésű hibrid egy jelentős szintlépés a FAO 400 eleji éréscsoportban!”



FRÖHLICH BENJÁMIN

/// **Bayer Crop Science**
Agronomist Lead, Seeds



DKC5068

2018-ban az Év Kukoricája

FAO 420-440



AZ ÉV KUKORICÁJA 2018



TERMŐKÉPESSÉG



TERMŐHELY-STABILITÁS

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- Kiváló termésstabilitása miatt kifejezetten ajánljuk olyan táblákra, ahol az évjáráthatás jelentősen befolyásolja a termést. Kitétebb helyeken is sikeresen termesztethető.
- Kitűnő vízleadásának köszönhetően jelentős lehet a szárítási költségmegtakarítás.
- A nagy termésekhez sem feltétlenül igényli a magas tőszámot.

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	nagyon jó
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	erőteljes
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	korai
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	flexibilis

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akiknél az évjáráthatás jelentősen befolyásolja a termést. Kiváló termésstabilitása miatt kitétebb helyeken is sikeresen termesztethető. 2018-ban az Év Kukoricájának választotta a Magyar Kukorica Klub.



/// DKC5068, Hódmezővásárhely, 2020



/// DKC5068, Kaba, 2020




/// DKC5068, Püspökladány, 2021

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// 42 közép-kelet európai Bayer fejlesztési kísérlet átlaga, 2020-2021

„Azoknak a termelőknek ajánljuk, akik olyan középérésű hibridet keresnek, melynél a termőképesség mellett kiemelten fontos a hibrid évjárat-stabilitása és az eltérő termőhelyekhez való alkalmazkodóképessége. A DKC5068 emellett kiváló agronómiai tulajdonságaival és kiemelkedő egészségprofiljával segíti a termelés kockázatának mérséklését.”



KÖKÉNY GÁBOR

/// Bayer Crop Science
Agronomist



DKC5110

Segít a silózásban, ha kell

FAO 430-450



TERMŐKÉPESSÉG



EGÉSZSÉGES TERMÉS



ZÖLD SZÁRON ÉRÉS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	jó
Termőhely-stabilitás	nagyon jó
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	erőteljes
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	magas
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	★★★★★
Csőflexibilitás	átmeneti

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Átlagos vagy átlag feletti termőpotenciállal rendelkező táblákra ajánlott.
- Magas várható termésszint esetén meghalálja a tőzsámsűritést, de átlagos és gyengébb körülmények esetén is kiválóan kompenzál.
- Korai fejlődési erélye és hidegtűrése kiemelkedő, azonban minimum 10°C talajhőmérséklet szükséges az egyenletes kelés biztosítása érdekében.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik egy kettős hasznosítású, robosztus, nagy zöldtömeget nevelő, kiváló csőegészséggel rendelkező hibridet keresnek, melyet kiváló beltartalmi mutatókkal rendelkező silóalapanyagként vagy szemes termésként is betakaríthatnak.



/// DKC5110, Sárvár, 2024



/// DKC5110 (felső), Versenytárs (alsó), Sárvár, 2024



/// DKC5110, Letenye, 2024

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

Bayer siló fejlesztési és szemes kísérleti eredmények

Hibrid	Száraz hozam (t/ha) átlag	Keményítőtartalom (g/kg sz.a) átlag
DKC5110	13,68	280
DKC5542	12,27	230
DKC5911	13,18	230
Versenytárs 1	11,84	235
Versenytárs 2	12,98	231
Versenytárs 3	11,92	160

/// 4 magyarországi Bayer fejlesztési silókukorica kísérlet, 2022



/// 80 közép-kelet európai Bayer fejlesztési kísérlet átlaga, 2021-2023

„Akik egy kiváló csőegészséggel rendelkező, robosztus habitusú, kettős hasznosítású hibridet keresnek, megtalálják számításaikat a DKC5110 személyében. Kiemelkedő beltartalmi mutatói és nagy zöldtömeget növelő tulajdonsága miatt hű társunk lehet a silózás során. Emellett a fejlesztői kísérleteinkben elért kiváló eredményei alátámasztják, hogy szemes takarmánnyként is bátran gondolhatunk rá.”



BALI DÁNIEL

/// Bayer Crop Science
Crop Strategist & Agronomist



DKC5148

Stabilan az élvezőnyben

FAO 440-460



TERMŐKÉPESSÉG



TERMÉSZTABILITÁS



CSŐFLEXIBILITÁS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	magas
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	★★★★★
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Az erős gyökérzetének és stabil szárának köszönhetően ellenáll a legtöbb negatív környezeti hatásnak.
- Termésstabilitása és aszálytűrése miatt kitett vagy gyengébb termőhelyekre is kifejezetten ajánljuk.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik kedvelték a DKC5182 hibridet és keresnék annak javított, a genetikai előrehaladásnak köszönhetően bőtermőbb utódját.



/// DKC5148, Regöly, 2024



/// DKC5148, Letenye, 2024



/// DKC5148, Várong, 2024

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS



KIVÁLÓ TERMŐHELY




JÓ TERMŐHELY




ÁTLAGOS TERMŐHELY

HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// Hazai terméseredmények, 2023



/// 21 közép-kelet európai Bayer fejlesztési kísérlet átlaga, 2023

„A DKC5148 remek választás azon gazdák számára, akik a legújabb DEKALB genetikai alapanyaggal szeretnék maximalizálni a termésbiztonságot. Friss regisztrációval rendelkező, minden termesztési szinten magabiztosan vethető FAO 450-es kukorica-hibrid. Agronómiai szempontból kifogásolhatatlan, flexibilis csőtípussal rendelkező, ígéretes új hibrid. Ha a DKC5182-t kedvelte, ezt imádni fogja!”



FRÖHLICH BENJÁMIN

/// Bayer Crop Science
Agronomist Lead, Seeds



DKC5182WX

Az igazi intenzív WAXY

FAO 450-480



TERMŐKÉPESSÉG



ERŐS GYÖKÉR ÉS SZÁR



KIMAGASLÓ SZEMMINŐSÉG

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	jó
Termőhely-stabilitás	jó
Évjárat-stabilitás	nagyon jó
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	★★★★☆
Csőflexibilitás	átmeneti

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Magas termőpotenciállal bíró területek hibridje, mely kiválóan reagál a tőszámsűrítésre.
- Kiváló szár- és gyökérerősségének köszönhetően megkésztet betakarítás esetén sem kell tartanunk megdőléstől.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik középérésű, magas terméshozamú waxy hibridet keresnek, intenzív termesztési körülmények mellé.



/// DKC5182WX, Boumourt,
Franciaország, 2021



/// DKC5182WX, Boumourt,
Franciaország, 2021



/// DKC5182WX, Oxyane, Meximieux,
Franciaország, 2021

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

Magas terméspotenciálú termőterületek WAXY hibridje

Jelentős terméselőny a DKC5031WX hibridhez képest



/// 12 franciaországi fejlesztési kísérlet átlaga, 2021

„A DKC5182WX hibridet azon gazdák számára ajánlom, akik magas termőképességű termőterületeken, intenzív termesztéstechnológiát folytatnak. Kiváló agronómiai tulajdonságokkal rendelkező, jó egészségprofil és kiváló termőhely-stabilitás jellemzi ezt a hibridet.”



AMANDINE TOURON

/// **Bayer Crop Science**
Solution Technical Assessment
Manager (STAM) for Western
Europe countries



DKC5206

Egészségprofilban verhetetlen

FAO 460-480



TERMÉSZTABILITÁS



TERMŐHELY-STABILITÁS



EGÉSZSÉGES TERMÉS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	nagyon jó
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	erőteljes
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	jó
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	★★★★★
Csőflexibilitás	átmeneti

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- Átlagos vagy átlag feletti termőpotenciállal rendelkező táblákra ajánlott.
- Magas várható termésszint esetén meghalálja a tőszám-sűrítést, mely erős szárnak köszönhetően nem jelent többetkockázatot.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik intenzív termesztési technológiában szeretnék csúcskategóriás hibridet termesztetni, valamint az elérhető maximális terméshozam mellett a csőegészség is fontos.



/// DKC5206, Pölöskefő, 2023



/// DKC5206, Sárbogárd, 2023




/// DKC5206, Murakeresztúr, 2023

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// DEKALB fejlesztési és értékesítési kísérletek, 2024



/// 111 magyarországi fejlesztési és értékesítési kísérlet átlaga, 2024

„A jól bevált DKC5182 helyett kerestem egy új, előremutató hibridet, mely nagyobb terméshozammal és jobb agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik. A DKC5206-ra esett a választásom, mely szélsőséges körülmények között is megalapozza a kukoricatermesztésem gazdaságosságát és nagyon elégedett vagyok a hozamteljesítményével.”



ÁCS NORBERT

/// Családi gazdálkodó,
Nagykanizsa, 2023-ban
az „Év fiatal agrárszakembere”



DKC5342 ^{ÚJ}

Stresszben verhetetlen

FAO 470-490



ASZÁLYTŰRÉS



TERMŐKÉPESSÉG



STRESSZTŰRÉS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	közép
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	nagyon jó
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	kései
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	★★★★☆
Csőflexibilitás	átmeneti

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Termésstabilitása és aszálytűrése miatt kitett vagy gyengébb termőhelyekre is kifejezetten ajánljuk. Aszály- és stressztűrésének köszönhetően kedvezőtelőbb évjáratokban is jól teljesít.
- Magas várható termésszint esetén meghalálja a tőzsámsűrítést, mely erős száranak köszönhetően nem jelent többletkockázatot.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

... akik a közép-kései éréscsoportban a jelenlegi legnagyobb terméspotenciállal rendelkező hibridet keresik, mely kitart az aszályos hónapokban is, és nem szakad össze megkésett betakarítás esetén sem.



/// DKC5342, Tiszavasvári, 2025



/// DKC5342, Tiszavasvári, 2025




/// DKC5342, Letenye, 2025

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// Közép-európai nemesítői kísérletek átlaga, 2024

„A DKC5342 egy hiánypótló hibrid a közép-kései éréscsoportban. Aszálytűrő képessége és stabilitása is kiemelkedő, a töszámsűrítésre jól reagál, erős szára és gyökere révén pedig a megkésett betakarítás sem fog problémát okozni. Azon termőhelyek sztárja, ahol a magas terméspotenciál mellett a stressztűrő képesség is kifejezetten fontos.”



KÖKÉNY GÁBOR

/// Bayer Crop Science
Agronomist



DKC5685

Korán érő kései

FAO 540-560



TERMŐKÉPESSÉG



KORAI VETHETŐSÉG



KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	kései
Termőképesség	
Aszálytűrő képesség	jó
Termőhely-stabilitás	jó
Évjárat-stabilitás	jó
Korai fejlődési erély	erőteljes
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	korai
Vízleadás	átlagos
Hektolitertömeg	
Csőflexibilitás	átmeneti

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- A hosszú tenyészidejű hibridek közül az egyik legkorábban vethető.
- Aki igazán nagy termést szeretne betakarítani, és biztosítani tudja a megfelelő víz- és tápanyagellátást is, annak ez a hibrid lehet a legjobb választás.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akiknél a megcélzott terméshozam a 12 t/ha vagy a feletti, és az éréscsoporton belül korán vethető hibridet keresnek. Kifejezetten jó körülményekre, intenzív termesztési területekre ajánljunk, ahol akár az öntözés is megoldott.



/// DKC5685, Dalmand, 2020



/// DKC5685, Gesztely, 2020




/// DKC5685, Létavértes, 2020

TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS




HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// DEKALB fejlesztési és értékesítési kísérletek, 2020

GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérlet
FAO 500, 2020



„A DKC5685 gyors vízleadással bír, ami többek között a csuhélevelek felnyílásának köszönhető. Nagyon jó korai fejlődésű hibrid, jobb mint a többi, piacon lévő kései hibrid. Jó termőhelyeken verhetetlen.”



ÁGNER ZITA

/// Bayer Crop Science
Pipeline Advancement Scientist



DKC5810

A későn aratók kedvence

FAO 550-570



TERMŐKÉPESSÉG



ASZÁLYTŰRÉS



GYORS VÍZLEADÁS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	kései
Termőképesség	★★★★★
Aszálytűrő képesség	kiváló
Termőhely-stabilitás	kiváló
Évjárat-stabilitás	kiváló
Korai fejlődési erély	átlagos
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	átlagos
Virágzási idő (érés csoporton belül)	kései
Vízleadás	gyors
Hektolitertömeg	★★★★☆
Csőflexibilitás	flexibilis

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Javasolt vetési idő: 10°C felett
- Erős szárának köszönhetően magas tőszámok alkalmazása vagy kései betakarítás esetén sem kell a növények megdőlésétől tartani.

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik egy kései virágzási- és érésidőjű stabil hibridet keresnek, mely alacsony tőszámon, akár aszályos évjáratban is kiváló terméshozamra képes. A DKC5810 kiváló aszály- és stressztűrő képességgel rendelkező hibrid, mely kötelező hibridje azon termelőknek, akik az elhúzódo aratási szezon végén szeretnék rekordtermést elérni.



/// DKC5810, Murakeresztúr, 2023



/// DKC5810 vs DKC5830, Sárvár, 2022




/// DKC5810, Sárvár, 2022

TERMÉSSZINTENKÉNTI TŐSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TŐSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK



/// 31 közép-európai fejlesztési kísérlet átlaga, 2021-2022

2022. évi IKR Agrár kukorica kísérletek kései csoportjának győztese 7 fős mezőnyben!

„A DKC5810 évek óta bizonyít Dél-Zalában, ahol a változó körülmények között is stabilan teljesít. Erős szár- és gyökérszerkezete révén megbízhatóan állja a késő őszi betakarítást, miközben vízleadása kategóriájában kiemelkedő. Hosszú tenyészideje lehetőséget ad arra, hogy a rekordterméseket célozzuk meg vele – ez a hibrid valóban képes a csúcshozamokra. Ideális választás azoknak, akik szeretnék a szezont ezzel a hibriddel zárni, hiszen biztosan talpon marad és gazdaságosan takarítható be. Ugyanakkor azoknak is jó döntés, akik nedves terményként kívánják értékesíteni a kukoricát, például a szabadegyházi etanolgyár felé, hiszen a DKC5810 ilyen piaci igényekhez is rugalmasan illeszkedik.”



STÉGER BENCE

/// **Bayer Crop Science**
Területi képviselő



DKC5911

Minőségi új siló

FAO 560-580



TERMŐKÉPESSÉG



ASZÁLYTŰRÉS



ZÖLD SZÁRON ÉRÉS

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Érésidő	kései
Aszáztűrő képesség	kiváló
Korai fejlődési erély	kirobbanó
Gyökérerősség	kiváló
Szárerősség	kiváló
Növénymagasság	magas
Virágzási idő (érés csoporton belül)	átlagos
Zöldhozam	★★★★★
Száraz hozam	★★★★☆
Zöldszáron érés	★★★★★
Sejtfal emészthetőség	★★★★☆
Energiatartalom	★★★★★
Növényegészség	★★★★★

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Állattenyésztők számára
- Tejtermelő gazdaságok számára
- Biogáz előállításra

AZOKNAK A PARTNEREINKNEK AJÁNLJUK...

...akik DEKALB szemeskukorica színvonalú, legújabb nemesítésű, kései silókukorica hibridet keresnek. A DKC5911 óriási termőképességgel, magas cső-részaránnyal rendelkező, zöld száron érő siló innovációnk, mely kiemelkedő beltartalmi paramétereivel és kiváló emészthetőségével az igényes gazdálkodók számára nyújt megoldást.



/// DKC5911, Murakeresztúr, 2023



/// DKC5911, Sárbogárd, 2022



/// DKC5911, Kaposfő, 2023


TERMÉSSZINTENKÉNTI TÖSZÁMAJÁNLÁS



HASZNÁLJA KI A HIBRIDBEN LÉVŐ TERMÉSPOTENCIÁLT, ÉS ÉRJE EL A LEHETŐ LEGNAGYOBB EREDMÉNYT A TÁBLA TERMÉSSZINTJÉNEK MEGFELELŐ TÖSZÁM HASZNÁLATÁVAL!

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

Zöldhozam eredmény



/// 15 magyarországi fejlesztési kísérlet átlaga, 2022-2025

Hibrid	DKC5911
Helyszín	Nagykanizsa, öntözetlen
Évjárat	2025
Zöld hozam (t/ha)	42,75
Száraz hozam (t/ha)	15,09
Szárazanyag (g/kg)	353
Keményítő (g/kg szá.)	393
Szerves anyagok emészthetősége Omd48 (%)	80,4
Emészthető rost mennyiség dNDF48 (g/kg szá.)	233
Emészthetetlen rost mennyiség iNDF240 (g/kg szá.)	83
Rost emészthetőség NDFd48 (%NDF)	65,1

„A megújult DEKALB silókukorica nemesítési program első hibridje a DKC5911. Ez a prémium hibrid a nagy zöldtermés mellett, magas energiatartalommal és kiváló egészségprofillal rendelkezik. Kiemelkedő szárazságtűrése és zöld száron érő tulajdonsága miatt rendkívüli módon képes növelni a tej- és energiatermelés jövedelmezőségét.”



FRÖHLICH BENJÁMIN

/// Bayer Crop Science
Agronomist Lead, Seeds



További eredményekért olvassa be a QR kódot vagy keresse weboldalunkon a **Silókukorica** fejlesztői eredményeket!

KUKORICA HIBRIDVÁLASZTÉKUNK

a 2026-os termesztési szezonban

További információért látogasson el ide: agro.bayer.co.hu/termek/vetomagok
Kövessen minket Facebook-on is: facebook.com/BayerCropScienceMagyarország

HIBRID	MINŐSÍTÉS	VETŐMAGVÉDELMI MEGOLDÁS	HASZNOSÍTÁS	ÉRÉSIDŐ	FAO	TERMŐ- KÉPESSÉG <i>Éréscsoporton belül</i>	ASZÁLYTŰRŐ KÉPESSÉG	TERMŐHELY- STABILITÁS	ÉVJÁRAT- STABILITÁS	KORAI FEJLŐDÉSI ERÉLY	GYÖKÉR- ERŐSSÉG	SZÁR- ERŐSSÉG	NÖVÉNY- MAGASSÁG	VIRÁGZÁSI IDŐ <i>Éréscsoporton belül</i>	VÍZLEADÁS	HEKTOLITER- TÖMEG	CSŐ- FLEXIBILITÁS
DKC3513			siló	igen-korai	280-290	5	kiváló	kiváló	kiváló	kirobbanó	jó	jó	magas	kései	átlagos	5	átmeneti
DKC3972			szemes	igen-korai	290-310	4	jó	kiváló	kiváló	jó	jó	jó	átlagos	korai	gyors	4	flexibilis
DKC4109			szemes	igen-korai	310-320	4	nagyon jó	kiváló	kiváló	kirobbanó	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	gyors	4	átmeneti
DKC4125		 	szemes	igen-korai	310-330	5	kiváló	kiváló	kiváló	erőteljes	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	átlagos	5	flexibilis
DKC4231			szemes	korai	320-330	4	kiváló	kiváló	kiváló	erőteljes	kiváló	kiváló	átlagos	korai	átlagos	5	flexibilis
DKC4253 		 	szemes	korai	320-330	5	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	kirobbanó	kiváló	kiváló	átlagos	kései	átlagos	5	flexibilis
DKC4391		 	szemes	korai	320-340	5	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	átlagos	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	gyors	5	flexibilis
DKC4391WX			waxy	korai	330-350	5	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	átlagos	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	gyors	5	flexibilis
DKC4433			szemes	korai	340-360	4	kiváló	nagyon jó	kiváló	átlagos	kiváló	kiváló	átlagos	kései	gyors	4	fix
DKC4533		  	szemes	közép-korai	350-360	5 +	kiváló	kiváló	kiváló	kirobbanó	jó	kiváló	átlagos	átlagos	átlagos	5 +	átmeneti
DKC4712 *			szemes	közép-korai	350-370	4	kiváló	nagyon jó	jó	átlagos	jó	átlagos	átlagos	átlagos	átlagos	5	flexibilis
DKC4897		  	szemes	közép-korai	390-400	5	nagyon jó	kiváló	kiváló	erőteljes	kiváló	átlagos	átlagos	átlagos	gyors	4	flexibilis
DKC5092		 	szemes	közép-korai	380-410	5	kiváló	nagyon jó	kiváló	jó	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	gyors	5	átmeneti
DKC5075			szemes	közép	400-420	4	kiváló	jó	jó	átlagos	kiváló	kiváló	átlagos	korai	átlagos	5	fix
DKC4933		 	szemes	közép	410-430	5	kiváló	kiváló	kiváló	átlagos	kiváló	kiváló	átlagos	kései	átlagos	4	flexibilis
DKC5068 *			szemes	közép	420-440	3	nagyon jó	kiváló	kiváló	erőteljes	kiváló	kiváló	átlagos	korai	gyors	5	flexibilis
DKC5110			kettős	közép	430-450	5	jó	nagyon jó	kiváló	erőteljes	kiváló	kiváló	magas	átlagos	átlagos	5	átmeneti
DKC5148		 	szemes	közép	440-460	5	kiváló	kiváló	kiváló	átlagos	kiváló	kiváló	magas	átlagos	átlagos	5	flexibilis
DKC5182WX			waxy	közép	450-480	5	jó	jó	nagyon jó	átlagos	kiváló	kiváló	átlagos	átlagos	gyors	4	átmeneti
DKC5206		 	szemes	közép	460-480	5	nagyon jó	kiváló	kiváló	erőteljes	kiváló	jó	átlagos	átlagos	gyors	5	átmeneti
DKC5342 			szemes	közép	470-490	5	kiváló	nagyon jó	kiváló	átlagos	kiváló	kiváló	átlagos	kései	átlagos	4	átmeneti
DKC5685			szemes	kései	540-560	4	jó	jó	jó	erőteljes	kiváló	kiváló	átlagos	korai	átlagos	5	átmeneti
DKC5810		 	szemes	kései	550-570	5	kiváló	kiváló	kiváló	átlagos	kiváló	kiváló	átlagos	kései	gyors	4	flexibilis
DKC5911		 	siló	kései	560-580	5	kiváló	kiváló	kiváló	kirobbanó	kiváló	kiváló	magas	átlagos	átlagos	5	flexibilis

* A DKC4712 és a DKC5068 hibrid csávázatlan formában is elérhető.



HITELESSÉG ÉS EREDETISÉG



Az eredetit nem pótolja semmi. Mégis próbálkoznak hamisítványokkal a vetőmagpiacon is.

Ez bizonyos szempontból elismerés, jelzi, hogy partnereink értékelik a tőlünk megszokott minőséget, ezért érdemesnek tűnik termékeinket hamisítani. Másrészt fontosnak tartjuk, hogy partnereink megbizonyosodhassanak termékeink eredetiségéről, s így a megszokott, kiváló minőséghez jussanak. Ezért a termékek eredetiségének ellenőrzési lehetőségét már vetőmagzsákjainkon is biztosítjuk.



Hogyan működik?

A Bayer **Safety Seal** a vetőmagzsák alján elhelyezett zárjegy, melynek segítségével könnyen ellenőrizheti a termék eredetiségét. A zárjegy egy hologrammos Bayer logót és egy egyedi QR kódot tartalmaz. Ezt a kódot a **Bayer CropScience Seal Scan** applikáció segítségével olvashatja be. Beolvasás után azonnali visszajelzést kap a vetőmag eredetiségéről.

Szerezze be az alkalmazást!

Töltse le a **Bayer CropScience Seal Scan** applikációt okos eszközére! Nincs szükség regisztrációra, a letöltés pedig ingyenes.



Azonnali visszajelzés a termék eredetiségéről:

Ha a vetőmagzsák alján megtalálható a zárjegy, olvassa be a letöltött applikáció segítségével, hogy megbizonyosodjon a termék eredetiségéről!



A kód érvényes.
A termék eredeti.



A kód ismeretlen.
A kód az applikáció által nem azonosítható.



A termék hamisítvány.

Figyelmeztetések:

- // Csak megbízható kereskedőtől vásároljon!
- // Csak a megbízható kereskedők forgalmazóhelyein vásároljon!
- // Szokatlanul alacsony vételár hamisításra utalhat.
- // Ellenőrizze a vetőmagzsák sértetlenségét, megjelenését!
- // Csak magyar nyelvű címkével ellátott vetőmagot vásároljon!



MEGÚJULT A WEBOLDALUNK!

Kukorica

A Bayer Crop Science a DEKALB premium vetőmagokat kiváló termékpartnerrel állítja elő.

DEKALB

Arlista

Hibridválasztékunk

Katalogus

Szilokul

Vetőmag hibridek

23 termék

DEKALB vetőmagjainkról ezután minden információt az agro.bayer.co.hu honlapon, a **Termékek/Vetőmagok** menüpontban talál meg.



Kukorica
DKC4897

Legjobb a stresszt



Kukorica
DKC5092

Zöldök napok



Kukorica
DKC4712

Csúskulcsban verhetetlen



Aktuális kukorica-
portfóliónk meg-
tekintéséhez olvassa
be a QR kódot!

Elérhetőségeink



Kollégáink közvetlen
elérhetőségéhez olvassa
be a QR kódot!

Bayer Hungária Kft. /// 1117 Budapest, Dombóvári út 26.



agro.bayer.co.hu/termekek/vetomagok



facebook.com/BayerCropScienceMagyarország

MINDIG OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A VETŐMAGZSÁKRA ERŐSÍTETT NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ, A VETŐMAG KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT! Az egyes eredmények és teljesítmények a termesztés helyétől és az évről függően változhatnak. A bemutatott eredmény csaktájékoztató jellegű, az Ön által elérhető eredmények szempontjából, melyeket a helyi termesztési, talaj és időjárási körülmények nagyban befolyásolhatnak. A termelőknek, amikor csak lehetséges, értékelniük kell a különböző helyeken és években mért adatokat és elért eredményeket. Az Acceleron® és a DEKALB® a Bayer Group bejegyzett márkanévei. Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2025 Bayer Group. Minden jog fenntartva.



06-20-980-4449

Hegedűs Zsolt

KukoricaVetomag.hu – Országos vetőmag webáruház

- Rendeljen kukorica vetőmagot kedvező áron **webáruházunkban**, vagy **telefonon**!
- Kedvezményes országos házhozszállítás, díjmentes raktári átvétel Kecskeméten.
- Kérdése van? Hívjon! **06-20-980-4449**

KukoricaVetomag.hu

Vetőmag megbízható helyről, olcsón és időben, 2005 óta!

Hivatalos fémzárolt **kukorica, napraforgó, cirok** vetőmagok kedvező áron:

Dekalb, Syngenta, Pioneer, KWS, Marton Genetics, Gabonakutató, Agromag, RAGT, LG Limagrain, Kiskun Kutatóközpont, Saaten Union, RWA, American Genetics, Caussade Semences, BC Institut, NS Seme.



syngenta

